

Flugling


Warum? - Schwarmverhinderung bei schwarmreifem Volk, Völkervermehrung, Varroareduktion

Wann? - Am frühen Nachmittag, bei gutem Flugwetter und gutem Trachtangebot, vor 16 Uhr

Material? - 1 Bienenkasten mit Mittelwänden

- 1-2 Brutwaben mit junger Brut aus Ursprungsvolk

- Futterwaben



Was passiert? Fast alle Flugbienen fliegen zum Flugling, ca. 40% des Ursprungsvolkes.

Wenn Schwarmverhinderung der Grund ist für die Fluglingsbildung:

Königin im Ursprungsvolk belassen, alle Schwarmzellen ausbrechen: Flugling zieht sich eine neue Königin aus Nachschaffungszellen

oder Königin im Ursprungsvolk abdrücken, bis auf 2 alle Schwarmzellen ausbrechen: U-volk und Flugling ziehen sich je eine neue Königin

oder Königin im Ursprungsvolk belassen, alle Schwarmzellenausbrechen und eine Brutwabe mit Schwarmzelle im Flugling platzieren.

Nicht vergessen: Varroabehandlung zur brutfreien Zeit.

Es gilt immer: Füttern falls nötig, Flugloch der Volksstärke anpassen.